

cystistat[®]

Cystistat[®] voor een Gezonde Blaas



Bewezen Beter & Veilig

Voor herstel en revitalisatie van een defecte blaaswand

- Pijnlijk Blaas Syndroom (PBS) - IC
- Radiatie- en Chemo Cystitis (preventie en behandeling)
- Recidiverende Bacteriële Cystitis



Cystistat[®] verbetert de Quality of Life



Sanmed BV • Postbus 71 • 1250 AB Laren (NH) • tel: 035-5381232
info@sanmed.nl • www.sanmed.nl

Voor de arts specialist Waarom Cystistat® .. ?

Het enige blaasspoelmiddel met hyaluronaat ^{high definition}, door fermentatie verkregen; niet van dierlijke oorsprong, zoals chondroïtine en heparine;

Cystistat® is een "Medical Device Class II" product [CE0473]; overige blaasspoelmiddelen voor IC zijn geclassificeerd als Class III ten gevolge van de aanwezigheid van grondstoffen van dierlijke oorsprong^(*)

^(*) chondroïtine wordt o.a. verkregen uit de trachea van runderen

Zeer hoog molecuulgewicht (wereldwijd gepatenteerd) derhalve super hydrophyl en als zodanig een unieke component voor regeneratie van het urothelium door middel van een adequate cel proliferatie;


Highlighted abbreviation of abstract as printed in Urology Vol 49 Issue 5, suppl.1, May 1997 Pages 111-113
Intravesical hyaluronic acid in the treatment of refractory interstitial cystitis

Alvaro Morales, Laurel Emerson, J. Curtis Nickel
From the Department of Urology, Queen's University, Kingston, Ontario, Canada

Objectives

.....to investigate the activity of hyaluronic acid (HA) in the treatment of IC. HA is an important glycosaminoglycan (GAG) present in all connective tissues, including the GAG layer of the vesical mucosa. It exhibits a variety of

Hyaluronaat ^{high definition} vormt de ruggegraat van de GAG laag waaraan andere stoffen zich kunnen hechten, zoals chondroïtine, heparine en keratine; zonder hyaluronaat ^{high definition} geen STABIELE GAG laag;



High definition wil zeggen dat Cystistat® bestaat uit zeer lange ketens van lichaamseigen hyaluronaat, dat op efficiënte wijze de basis legt voor een gezonde en stabiele GAG laag;

Het molecuul gewicht van hyaluronaat in Cystistat® bepaalt de superbinding met water en de meest effectieve wijze van docking zodanig dat er een efficiënte endogene HA productie in stand wordt gehouden.....HA **high definition** heeft een molecuulgewicht van minimaal 700.000 Dk (patent); overige HA blaasspoelmiddelen hebben een laag molecuulgewicht van beneden de 200.000 Dk ...

Meer dan 550.000 instillaties, wereldwijd; meer klinische ervaring met Cystistat® dan met enig ander blaasspoelmiddel;

Cystistat® is het onderwerp van meer klinische studies, uitgevoerd door internationaal bekende klinici en onderzoekers/wetenschappers, dan alle andere blaasspoelmiddelen tezamen. Immers, Cystistat® wordt wereldwijd gebruikt en meer dan 75.000 patiënten zijn gespoeld met Cystistat®

Intra- en extra muraal toe te passen, in samenwerking met erkende thuiszorg organisaties;

..... vraag naar de voorwaarden.